

| Działanie                                                                                                                                                               | Środki Ochrony Indywidualnej |                 |                        |                   |                    |                  | Komentarz                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Rękawice                     | Fartuch foliowy | Przyłbica <sup>1</sup> | Fartuch barierowy | Maska chirurgiczna | Maska filtrująca |                                                                                                                                                                                                                   |
| Przeprowadzenie procedury związanej z wytwarzaniem aerozoli u pacjenta z możliwym lub potwierdzonym zakażeniem                                                          | ✓                            | ✓               | ✓                      | ✓                 | X                  | ✓                | Narażenie na kontakt z aerozolami, zdolnymi do przenoszenia patogenów oddechowych, powstającymi podczas zabiegu                                                                                                   |
| Praca w środowisku, w którym przeprowadzane są zabiegi, z wytwarzaniem aerozoli (opieka nad pacjentem w stanie krytycznym), gdy bezpośrednio nie wykonuje się procedury | ✓                            | X*              | ✓                      | ✓                 | X                  | ✓                | *W przypadku podłączania/odłączania pacjenta od hemodializy należy dodatkowo zakładać fartuch foliowy                                                                                                             |
| Podłączanie/odłączanie od hemodializy pacjenta z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem                                                                              | ✓                            | ✓               | ✓                      | ✓                 | ✓*                 | X                | Zmieniać fartuch foliowy pomiędzy pacjentami<br>*używać maski filtrującej gdy potwierdzone zakażenie lub gdy podejrzenie i towarzysząc objawy kliniczne nasilające wysiłek oddechowy (kaszel, nasilona duszność). |
| Praca przy pacjencie z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem (w odległości mniejszej niż 2 m)                                                                       | ✓                            | X               | ✓                      | ✓                 | ✓*                 | X                | *Lub maska filtrująca w zależności od lokalnych wytycznych                                                                                                                                                        |
| Pobieranie wymazów z nosa i gardła                                                                                                                                      | ✓                            | X               | ✓                      | ✓                 | ✓*                 | X                | *Lub maska filtrująca w zależności od lokalnych wytycznych                                                                                                                                                        |
| Proces segregacji (Triage)                                                                                                                                              | ✓                            | ✓*              | ✓                      | X                 | ✓                  | X                | Wstępna ocena ryzyka przez telefon, zachowanie 2 m dystansu społecznego w momencie wejścia do placówki<br>*Pl: fartuch fazelinowy                                                                                 |
| Sprawowanie bezpośredniej opieki podczas zabiegu hemodializy nad pacjentem bez podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia (w odległości mniejszej niż 2 m)                 | ✓                            | ✓               | ✓                      | X                 | ✓                  | X                | Zapewnić przestrzeganie standardowych środków ostrożności związanych z wirusami przenoszonymi przez krew                                                                                                          |
| Praca w obszarze przyjęcia/wspólnym oraz obszarach klinicznych bez przeprowadzania zabiegów                                                                             | X                            | X               | X                      | X                 | ✓                  | X                | Cały personel powinien zachowywać dystans społeczny 2 m.<br>Adekwatne użycie ŚOI <sup>2</sup> dla personelu nie pracującego w obszarze klinicznym                                                                 |

<sup>1</sup> Gogle ochronne/okulary nie stanowią odpowiedniej ochrony przy opiece nad pacjentem z zakażeniem COVID-19, wymagane są przyłbice osłaniające całą twarz.

<sup>2</sup> Adekwatne użycie ŚOI powinno zawsze podlegać ocenie ryzyka i uwzględniać kwestię wskaźnika zakażeń w społeczności lokalnej

## Powiązane polityki i procedury:

PL-06-38 Zarządzanie i stosowanie masek na twarz podczas pandemii lub epidemii wersja 002

## Referencje:

- Recommended PPE for primary, outpatient and community care by setting, NHS and independent sector, Public Health England, 02.04.2020
- Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) Interim guidance, WHO, 27 February 2020

## Historia dokumentu:

| Data powstania / przeglądu | Wersja   | Główne zmiany                                                           | Autor / Sprawdził                                |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 09.04.2020                 | 01.001   | Pierwsza wersja robocza                                                 | J Cowperthwaite                                  |
| 16.04.2020                 | 001      | Pierwsza wersja                                                         | J Cowperthwaite, JL Almeida, P Das, M Bento      |
| 16.09.2020                 | 001      | Wersja 001 pl                                                           | M.Serwańska – Świątek, A.Stelmaszyk, K.Marciniak |
| 29.10.2020                 | 001_pl02 | Wprowadzenie zmiany <i>kursywą w kolorze niebieskim</i> w dokumencie PL | M.Serwańska – Świątek                            |