





Postępowanie po ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny



Działania bezpośrednio po ekspozycji

- Nie wyciskać ani wysysać rany, nie tamować krwawienia (chyba że jest zagrażające życiu);
- Ranę płukać pod bieżącą wodą 3-5 minut (jeśli wykonalne) i umyć zranione miejsce wodą z mydłem;
- Nie szorować rany podczas jej mycia;
- Po umyciu osuszyć ranę i zdezynfekować preparatem niezawierającym alkoholu;
- Ranę zabezpieczyć wodoodpornym plastrem, opatrunkiem.

Zanieczyszczenie błony śluzowej jamy ustnej, nosa, spojówek oczu:

- Błony śluzowe i spojówki przepłukać jałowym roztworem 0,9% NaCl lub czystą wodą;
- Przy dostaniu się materiału do jamy ustnej - przepłukać kilkakrotnie jamę ustną wodą.

Zgłoszenie zdarzenia

- Zgłosić fakt przełożonemu (**Wykaz zranień ostrymi narzędziami**)
- Odnotować zdarzenie (**System zdarzeń niebezpiecznych AGIR**)
- Poinformować pracownika BHP (**Karta ekspozycji zawodowej**)
- Poinformować lekarza dyżurnego (**Skierowanie na badanie
pracownika eksponowanego na materiał potencjalnie zakaźny**)

Pobranie materiału do badań

- Natychmiast po zdarzeniu należy pobrać krew na badania wirusologiczne u osoby eksponowanej oraz osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia (Zgoda na badania krwi pod kątem nosicielstwa wirusów HBV, HCV, HIV)
- Kolejne badania tj. przeciwciała anty-HIV, antygen HBs, przeciwciała anty-HCV, należy przeprowadzić po 6tyg., 3 miesiącach, 6 miesiącach, a ALAT należy wykonywać co miesiąc przez 6 kolejnych miesięcy od daty ekspozycji. Fakt ich wykonania odnotować w Karcie ekspozycji zawodowej.

Kontrola w ośrodku specjalistycznym

- Należy zgłosić się jak najszybciej (najlepiej w ciągu 48 godzin) do ośrodka specjalistycznego celem oceny wskazań do profilaktyki zakażenia HIV i HBV
- Potrzebne dokumenty: Aktualne wyniki badań, Karta ekspozycji zawodowej
- Adres najbliższej placówki: