

Protokół odstawiania immunosupresji po powrocie na dializy*

SCHEMAT: CNI + MMF (AZA) + prednizon (Encorton)

Odstawić MMF (AZA) z chwilą rozpoczęcia dializy

CNI redukować stopniowo do całkowitego odstawienia po 4–6 tyg.
Jeśli podejrzenie/ objawy AR – zwolnić tempo redukcji.

Po odstawieniu CNI rozpocząć redukcję prednizonu o 1 mg/miesiąc
Jeśli podejrzenie/ objawy AR – zwolnić tempo redukcji.

CNI = inhibitory kalcyneuryny (takrolimus, cyklosporyna)

MMF = mykofenolan mofetilu, mykofenolan sodu

AZA = azatiopryna, Imuran

AR = acute rejection/ ostre odrzucanie

* Na podstawie Phuong-Thu Pham and and Phuong-Chi Pham

SCHEMAT: CNI + m-TOR inh + prednizon (Encorton)

Odstawić m-TOR inh z chwilą rozpoczęcia dializy.

CNI redukować stopniowo do całkowitego odstawienia po 4–6 tyg.
Jeśli podejrzenie/ objawy AR – zwolnić tempo redukcji.

Po odstawieniu CNI rozpocząć redukcję prednizonu o 1 mg/miesiąc
Jeśli podejrzenie/ objawy AR – zwolnić tempo redukcji.

m-TOR inh = inhibitory mTOR (everolimus, rapamycyna)

MMF = mykofenolan mofetilu, mykofenolan sodu

AZA = azatiopryna, Imuran

* Na podstawie Phuong-Thu Pham and and Phuong-Chi Pham